

MONITOROVACÍ ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ

č.: 4

Týden: 22

Období: 29. 5. - 4. 6. 2018

PADLÍ RÉVOVÉ ●●

V závěru minulého období se vytvářely vhodné podmínky pro rozvoj padlí, síla infekčního tlaku se zvyšovala na vyšší úroveň. Předpověď na první polovinu tohoto týdne slibuje teploty okolo 28 °C a poměrně suché počasí, což bude dále zvyšovat riziko vyššího infekčního tlaku. Rozvoj padlí by mohly negativně ovlivnit případné silné dešťové srážky, kdy by došlo ke smytí patogenu z porostů. Réva se nachází v citlivém období, kdy na některých místech došlo k rychlému odkvětu, pozdní odrůdy odkvetou díky vhodným podmínkám dříve, takže bude důležité tento stav nepodcenit. Nastává citlivé období vývoje bobulí do velikosti hrachu, kdy mohou být snadno napadnutelné padlím. Vhodným řešením vzhledem k současnému vývoji bude provést ochranu pomocí intenzivních systémových fungicidů (**Prosper, Vivando, Luna, Collis, Dynali**).

PLÍSEŇ RÉVOVÁ ●

V minulém týdnu se vyskytovaly převážně občasné přeháňky nebo lokální bouřky, které mohly zapříčinit opakované splnění podmínky pro rozvoj primárních infekcí. V tomto týdnu se mohou vyskytnout v první polovině období další srážky, zejména v odpoledních hodinách-buď ve formě přeháněk nebo i bouřek. Malé broky po odkvětu, které ještě nemají vytvořenu voskovou vrstvičku na povrchu, fungují jako listy a jsou snadno napadnutelné plísní. Nyní je důležité situaci nepodcenit a provést ošetření systémovými přípravky (**Melody Combi, Cassiopee, Pegaso, Ridomil**).

BOTRYTIOVÁ HNILOBA KVĚTENSTVÍ RÉVY ●

Na některých lokalitách bylo zjištěno slabé napadení květenství u citlivých odrůd. Způsobily to srážky v minulých obdobích. V případě chladného počasí a srážek v období květu se doporučuje provést ošetření přípravky buď s vedlejší (**Melody Combi, Cassiopee**), anebo přímou účinností na plíseň šedou (**Switch, Thiram Granulfo**).


Riziko rozvoje: ● slabé ● střední ●● silné

DETAILNÍ PŘEHLED O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ

obec	Infekční tlak		Doporučené přípravky dle infekčního tlaku	
	padlí révové	plíseň révová	padlí révové	plíseň révová
Blatnice			Dynali	-
Bořetice			Vivando	Pegaso F
Bzenec				Mildicut
Čejč				
Lednice				
Lužice				
Mikulov				
Němčičky				
Nosislav				
Pavlov				
Popice				
Přítluky				
Ratíškovice				
Stoškovice				
Strážnice				
Těšany				
Tvrdonice				
Valtice				
Velké Bílovice				
Velké Pavlovice				
Vnorovy				
Znojmo				
Modra (SK)				
Šenkvice (SK)				
Svatý Jur (SK)				
Legenda	slabý	střední	silný	nehodnoceno



Výhled počasí



Důležité informace

Réva se nachází v období kvetení, ranější odrůdy (Solaris, Irsay Oliver, Chardonnay) rychle a kvalitně odkvetly, zbytek odrůd toto období brzy ukončí. Optimální podmínky pro kvetení se vyznačují teplotou 25-30 °C, suchým počasím.

Také dochází ke skokovému nárůstu potřeb na živiny. Která živina se problematicky do keřů révy dostává a jakou ideální výživu použít, aby byly listy, resp. růst opět zdravý, pomohou odhalit **rozbory listů (základní, rozšířený)**.

